

ТУ У 20.4-41429353-001:2018

Местный противовоспалительный препарат с антипролиферативным и иммуномодулирующим эффектом на натуральной основе для предупреждения развития неопластических изменений, предотвращения рецидивов после противоопухолевой терапии при урологических, проктологических и гинекологических заболеваниях органов малого таза

Состав:

Действующие вещества:

активированный экстракт прополиса

экстракт зверобоя

экстракт окопника лекарственного

экстракт чистотела

экстракт катарантуса (барвинка) розового

цинк

Вспомогательные вещества:

твердый жир

пчелиный воск

аскорбиновая кислота

полисорбат

диметилсульфоксид

полиэтиленгликоль

Терапевтические свойства:

Поликомпонентный натуральный препарат **АПИ-НОРМ® НЕО** сочетает эффект восстановления истощенного потенциала защитных механизмов клетки с эффектами подавления нежелательной повышенной пролиферации и активации функции самоуничтожения дефектных клеток, приводя эти функции до физиологической нормы.

Ректальная форма применения позволяет доставить к клеткам необходимое количество и разнообразие биологически активных веществ поликомпонентных натуральных препаратов минуя их разрушение в пищеварительном тракте и печени.

Многокомпонентный состав **АПИ-НОРМ® НЕО** при местном применении обеспечивает:

угнетение избыточной пролиферации;

детоксикацию продуктов распада клеток и других токсинов;

снятие избыточной нагрузки с антиоксидантных и других защитных механизмов клетки;

локальное пополнения истощенных резервов микроэлементов и макромолекул, необходимых для обеспечения систем клеточной защиты;

восстановление и нормализацию иммунных свойств клеток и тканей;

разрушение защитной биопленки бактерий, что обеспечивает их терапевтическую доступность;;

защитное восковое антисептическое покрытие поверхности раны и нервных окончаний;

снятие воспалений и отечности при умеренном обезболивающем эффекте;

глубокое проникновение действующих веществ во все органы малого таза;

нормализацию микробиоценоза полых органов малого таза;

снижает действие факторов, стимулирующих перерождение клеток, чем препятствует развитию предраковых состояний и предотвращает рецидивы неоплазий.

Применение:

для **профилактики** развития неопластических процессов в органах малого таза, усиление местного иммунного ответа, инициации апоптоза (гибели) измененных клеток, снижение вероятности процесса метастазирования в тазовые лимфатические узлы;

в комплексной терапии в качестве вспомогательного средства перед оперативными вмешательствами и после противоопухолевой терапии для снижения локальной интоксикации, восстановления иммунной защиты, для предотвращения осложнений и предупреждения рецидивов. для создания условий "безопасному" физиологическому заживлению послеоперационных ран с ингибированием избыточной пролиферации, восстановления иммунной защиты и предупреждения рецидивов.

при паллиативном уходе как местное противоотечное, противовоспалительное и обезболивающее средство с эффектом сдерживания роста, малигнизации и распространения новообразований.

Показания к применению:

в проктологии при аденоматозных полипах, хронических воспалительных процессах, с угрозой возникновения и развития неопластических изменений прямой и сигмовидной ободочной кишки;

в урологии при хронических воспалительных процессах, угрожающих развитием неопластических изменений предстательной железы, мочевого пузыря, семенных пузырьков и других органах малого таза;

в гинекологии при хронических воспалительных процессах и неопластических изменениях матки, фаллопиевых труб и яичников.

Противопоказания:

не применять при беременности. В период лечения необходимо прекратить грудное вскармливание. С осторожностью применять при тяжелых нарушениях функции печени, проявлении индивидуальной гиперчувствительности к любому из компонентов препарата. Во время лечения целесообразно воздерживаться от половых отношений, других травмирующих действий, употребление острой пищи и спиртосодержащих напитков.

Способ применения:

Общие положения. Перед использованием препарата для улучшения всасывания через прямую кишку действующих веществ, желателно опорожнить кишечник. Суппозиторий вводят в прямую кишку на глубину указательного пальца. Курс необходимо начинать с 1 суппозитория в сутки. Схему приема, дозировку и длительность использования устанавливают индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания, общего состояния и возраста. После 10-15 дней применения (один курс), следует делать перерыв на 5 дней. После 3-х курсов делают перерыв не менее трех недель для нормализации показателей крови и общего состояния.

При хронических воспалительных процессах и неопластических изменениях в органах малого таза применяют по 1 суппозиторию на ночь в течение 10-15 дней. Таких курсов может быть до трех. Перерыв между курсами должен составлять 5 дней.

В период реабилитации после лучевой и химиотерапии АПИ-НОРМ® НЕО применяют на второй день по окончании лучевых курсов и на 7-10 -й день после окончания курса химиотерапии по 1 свече на ночь в течение 10-15 дней. Продолжительность применения определяют динамикой реабилитации. В случае медленной положительной динамики

курс можно повторить, сделав перерыв в приеме 5 дней. Таких курсов может быть до трех.

В предоперационный период АПИ-НОРМ® НЕО используют для уменьшения воспалительных процессов и повышения резектабельности опухоли. С этой целью применяют по 1 свече на ночь в течение 5-10 дней. Для обеспечения хорошей видимости операционного поля применение суппозитория необходимо прекратить за 2-3 дня до операции.

В послеоперационный период на второй день после оперативного вмешательства на органах малого таза для снятия отека, предупреждения воспалений, сепсиса, обезболивания и угнетения избыточной пролиферации суппозитория **АПИ-НОРМ® НЕО** можно вводить по 1-2 свечи в сутки. Длительность применения определяется динамикой восстановительных процессов. Через 10-15 дней приема необходимо делать перерыв на 5-7 дней.

В гинекологии для усиления терапевтической доступности фаллопиевых труб и яичников применяют одновременно вагинальные суппозитории **АПИ-НОРМ® НЕО** - вагинально и ректальные суппозитории **АПИ-НОРМ® НЕО** - ректально по 1 свече каждого вида на ночь. Курс двойного применения составляет 10 дней. Перерыв между курсами должен быть 5 дней. Решение о дальнейшем применении принимается по результатам оценки динамики изменений.

Для паллиативной помощи и в случаях невозможности или нецелесообразности дальнейшего проведения полноценной цитотоксической терапии и хирургического вмешательства, суппозитории **АПИ-НОРМ® НЕО** применяют для торможения развития опухолевого процесса, снятия воспалений, обезболивания, улучшения общего состояния. Можно использовать как эпизодически, так и курсами, продолжительностью 10-15 дней по 2-3 суппозитория в сутки. Между курсами нужно делать перерывы по 5-7 дней.

Для предупреждения развития рецидивов хронических воспалений и неопластических изменений в органах малого таза, у пациентов, имевших онкологический инцидент или генетическую предрасположенность, рекомендуется каждые три месяца в течение двух лет и особенно в осенний и весенний периоды проводить профилактические курсы по 1 свече на ночь, ежедневно или через день на протяжении 10-15 дней. В зависимости от самочувствия и при ухудшении состояния ремиссии можно проводить дополнительные поддерживающие курсы по 1 свече в течение 10 дней.

Побочные действия:

Возможны общая слабость, головокружение, тошнота, боль в суставах, расстройства желудочно-кишечного тракта, **жжение** и зуд в прямой кишке. При появлении подобных симптомов прием препарата уменьшают до 1 суппозитория в сутки на срок до 3-5 дней. После чего следует продолжить намеченный курс. Если вышеуказанные или другие побочные эффекты, которые ранее не наблюдались длятся более 3-5 дней, нужно приостановить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Возможно усиление указанных побочных эффектов.

Условия хранения:

Хранить от + 2 ° до + 21 ° С в темном, недоступном для детей месте.

Срок годности:

24 месяца.

Не является лекарственным средством.