

состав

(На 1 таблетку массой 1,1 г): цитиколин - 250 мг, кальция фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, поливинилполипиролон, магниевые соли жирных кислот, тальк, диоксид кремния.

Пищевая (питательная) ценность на 1 таблетку: белки - 0 г, жиры - 0 г, углеводы - 0,028 г энергетическая ценность (калорийность) на 1 таблетку: 0,11 ккал.

Пищевая (питательная) ценность на 100 продукта: белки - 0 г, жиры - 0 г, углеводы - 2,5 г; энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта: 10 ккал.

Рекомендации по применению

Аксобрекс может быть использован по рекомендации врача в качестве дополнительного источника биологически активных веществ в рацион питания взрослых, способствует:

- улучшению концентрации внимания;
- повышению интенсивности умственной деятельности;
- улучшению памяти в условиях повышенного интеллектуального нагрузки;
- улучшению мозгового кровообращения.

Свойства цитиколина:

- способствует повышению уровня мозговой деятельности, снижению уровня амнезии, улучшению состояния при когнитивных, сенситивных и моторных расстройствах, наблюдаемых при ишемии мозга
- помогает стимулировать биосинтез структурных фосфолипидов в мембране нейронов, способствует улучшению функций мембран, в том числе функционированию ионообменных насосов и нейрорецепторы;
- участвует в подавлении деятельности некоторых фосфолипаз, препятствовании остаточному высвобождению свободных радикалов, предупреждении повреждения мембранных систем и обеспечении сохранности защитной антиоксидантной системы;
- оказывает противоотечные свойства, оказывает положительное

влияние в уменьшении отека мозга, благодаря стабилизирующей  
действия на мембрану;

может стимулировать уменьшение объема поврежденной ткани,  
способствуя уменьшению риска гибели клеток, действуя на механизмы  
апоптоза, и помогает улучшать холинергическую передачу;

способствует функциональной реабилитации при острых нарушениях  
мозгового кровообращения, осуществляя положительное влияние на  
уменьшение ишемического повреждения тканей мозга

помогает сокращать продолжительность восстановительного периода и  
уменьшать интенсивность посттравматического синдрома при черепно-  
мозговых травмах.

Рекомендации по применению

взрослым по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды.

Продолжительность приема 15-30 дней, более длительное применение  
согласовать с врачом.

предостережение

индивидуальная непереносимость компонентов. Не применять вместе с  
препаратами, которые содержат Центрофеноксин. Не применять детям и  
женщинам во время беременности и кормления грудью. Превышать  
рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве  
замены полноценного рациона питания. Перед применением  
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является  
лекарственным средством.

условия хранения

хранить в упаковке производителя, в сухом помещении при температуре  
не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

срок годности

2 года.

форма выпуска

таблетки, 30 таблеток в картонной коробке (3 блистера по 10 таблеток).