

**Состав**

1 таблетка содержит: глюкозамина сульфат 500 мг; хондроитина сульфат 300 мг; L-цистеин 100 мг.

*Состав:* глюкозамина сульфат 2KCl (из ракообразных), натриевая соль хондроитина сульфата, L-цистеина гидрохлорида моногидрат; наполнитель — микрокристаллическая целлюлоза, стабилизатор — поливинилполипирролидон, натрия кроскармеллоза, декстроза, мальтодекстрин, антислепающие агенты — магния стеарат, кремния диоксид, оболочка таблетки (глазирующий агент — поливиниловый спирт, краситель — титана диоксид, глазирующий агент — полиэтиленгликоль, антислепающий агент — тальк, красители — железа оксид желтый, железа оксид красный, железа оксид черный).

**Свойства**

Артрон Комплекс Плюс содержит хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, L-цистеин. Хондроитин является главным компонентом хряща. Хрящ, в котором содержится необходимое количество хондроитина, обладает правильной эластичностью и механическими свойствами. В здоровом организме в достаточном количестве имеется глюкозамин, который способствует образованию синовиальной жидкости и поддержанию ее необходимого уровня. L-цистеин — это серосодержащая аминокислота, которая способствует формированию коллагена — основы соединительной ткани организма. Глюкозамин и хондроитин являются натуральными компонентами, присутствующими в организме человека, главными составляющими хрящевой ткани. L-цистеин - это аминокислота, природно синтезирующаяся в организме.

**Рекомендации по применению**

Артрон Комплекс Плюс может быть рекомендован для коррекции рациона питания взрослых как дополнительный источник хондроитина, глюкозамина и L-цистеина.

**Способ применения**

Употреблять взрослым по 2 таблетки в сутки, запивая стаканом воды. Срок употребления согласовывается с врачом.

**Предостережение**

Не следует употреблять людям, имеющим индивидуальную непереносимость компонентов продукта, детям, беременным или женщинам, кормящим грудью. Лицам с заболеванием щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых заболеваний, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не употреблять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Не является лекарственным средством.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в защищенном от влаги месте.

**Форма выпуска**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 60

