

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для застосування медичного виробу**

**ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ**

**Склад:**

1 ампула містить води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл.

**Опис**

Стерильна, прозора, безбарвна рідина.

**Форма випуску**

Розчинник для парентерального застосування.

**Властивості**

Вода для ін'єкцій хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

**Призначення**

Для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

**Протипоказання**

Вода для ін'єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не застосовується, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник. Не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Вода для ін'єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими і діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

**Особливості застосування**

Вода для ін'єкцій призначена тільки для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене застосування води для ін'єкцій.

Вода для ін'єкцій не може бути безпосередньо введена внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу.

Вода для ін'єкцій призначена тільки для одноразового використання. Невикористану рідину слід знищити. Перед застосуванням води для ін'єкцій слід провести візуальну перевірку ампули. Можна використовувати тільки прозору рідину, вільну від часток та без видимих механічних пошкоджень ампули. За наявності скаламучення, часток або механічних пошкоджень ампули – ампулу з рідиною слід знищити.

**Застереження**

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

*Застосування у період вагітності або годування груддю*  
Застосовується у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами*  
Не впливає.

### **Спосіб застосування**

Приготування розчинів лікарських і діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій. Кількість води для ін'єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.

1. Уважно огляньте ампулу, прочитайте назву виробу, його кількість і термін придатності.
2. Струсіть ампулу, щоб рідина опустилася вниз.
3. Ватюю, змоченою спиртом, протріть ампулу і відламайте кінчик в напрямку від себе (краще обгорнути ампулу серветкою або ватюю - так ви захистите себе від випадкового порізу склом ампули).
4. Опустіть голку зі шприцем в ампулу, потягніть поршень на себе і наберіть рідину.

### *Діти*

Застосовують у педіатричній практиці.

### **Передозування**

Не описано.

### **Побічні реакції**

Не описані.

### **Термін придатності**

4 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 2 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці;  
по 5 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

АТ «Лубнифарм».

### **Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.