

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

Состав:

настойка цветков и цветочных корзинок календулы (1:10);

вспомогательное вещество: спирт этиловый 70%;

основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-бурого цвета со слабым специфическим запахом, горьковатая на вкус; при хранении допускается образования осадка;

Форма выпуска.

Настойка.

Фармакотерапевтическая группа.

Препараты, которые способствуют заживлению ран.

Код АТС D03A X09.

Фармакологические свойства.

Биологически-активные вещества, которые содержатся в цветах и цветочных корзинках календулы (флавоноиды и каротиноидные гликозиды, сапонины, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты) оказывают противомикробное, противовоспалительное и умеренное желчегонное действие.

Показания для применения.

Календулы настойку применяют местно как антисептическое средство при инфицированных (гнойных) ранах, порезах, ожогах кожи и при воспалении слизистых оболочек полости рта, десен (стоматит, гингивит), глотки, миндалина (фарингиты, ангина), **внутрь** — как желчегонное средство при дискинезиях желчевыводящих путей, холангитах, холециститах (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы.

Календулы настойку принимают внутрь за 15–30 минут до еды, разводя в небольшом количестве теплой кипяченой воды.

Взрослым рекомендуется применять по 10–20 капель настойки 3–4 раза в день на протяжении 1 месяца.

Детям с 12 лет — из расчета 1 капля настойки на 1 год жизни.

Для полоскания полости рта 1 чайную ложку календулы настойки разводят в стакане теплой кипяченой воды.

Способ применения препарата для местных аппликаций зависит от характера поражения кожи и определяется врачом.

Побочное действие.

Препарат, как правило, хорошо переносится, тем не менее у некоторых больных при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций (покраснение кожи, сыпь, зуд и т.п.).

Противопоказания.

Календулы настойка противопоказана при индивидуальной непереносимости любого из компонентов препарата.

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется употреблять внутрь на протяжении продолжительного времени, а также детям до 12 лет и женщинам в период беременности и кормления грудью.

Передозировка.

Информация отсутствует.

Особенности применения.

Если вы принимаете календулы настойку внутрь, вам следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально-опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Календулы настойка усиливает действие других противовоспалительных и желчегонных средств (в частности, препаратов на основе ромашки и тысячелистника).

Условия и срок хранения.

Хранить в прохладном (8–15 °С), защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности — 4 года.

Условия отпуска.

Без рецепта.

Упаковка.

По 50 мл во флаконах.