

ИНСТРУКЦИЯ

для медицинского применения препарата

Показания к применению:

Холециститы, холангиты, гепатиты с задержкой желчеотделения, циститы, почечнокаменная болезнь, отеки, обусловленные нарушением сердечной деятельности, геморрагические диатезы, кровотечения различного происхождения.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к растительному средству.

Способ применения:

10 г (1 десертная ложка) столбиков с рыльцами помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают в процеженный настой. Настой доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1-3 столовые ложки каждые 3-4 часа. Дети в зависимости от возраста — от 1 десертной ложки до 2 столовых ложек каждые 3-4 часа. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

2 фильтр-пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1-3 столовые ложки каждые 3-4 часа. Дети в зависимости от возраста — от 1 десертной ложки до 2 столовых ложек каждые 3-4 часа. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Категория отпуска:

Без рецепта.