

УТВЕРЖДЕНО

Приказ повідомлень

здороохранення України

28.07.2005 № 381

Регистрационное удостоверение

№ UA / 3551/01/01

ІНСТРУКЦІЯ

за медичним застосуванням препарату

НЕФРОФИТ

(НЕФРОФІТУМ)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: смесь кусочків різних форм

серовато-зеленого кольору, з бурими, жовтими та білими включеннями, з ароматним

запахом;

состав: 1 упаковка (100 г) містить кольорові бузини чорної 9 г, листьєві м'яти

перечної 8 г, стільниковий з рильцями кукурузи 8 г, корневий лопуха 8 г, корней

одуванчика 8 г, трави пастушієї сумки 8 г, листьєв подорожника більшого 9 г,

квітка ромашки 8 г, трави спориша 9 г, листьєв толокнянки 8 г, трави хвоца

полевого 9 г, трави череди 8 г;

1 фільтр-пакет (1,5 г) містить кольорові бузини чорної 135 мг, листьєві м'яти

перечної 120 мг, стільників з рильцями кукурузи 120 мг, корневої лопухи 120 мг,

корнева одуванчика 120 мг, трави пастушієї сумки 120 мг, листьєв подорожника

великого 135 мг, квітів ромашки 120 мг, трави спориша 135 мг, листьєв толокнянки 120 мг, трави хвоца полевого 135 мг, трави череди 120 мг.

Форма випуска. Сбор.

Фармакотерапевтична група. Середності, притаманні в урології.

Код АТС G04B X 50 **.

Фармакологічні властивості. Фармакодінаміка. НЕФРОФИТ оказує
Можливе дію і підвищує азотовидільну функцію печінки, має легко
салуретичне дію. Позитивно впливає на мочевинообразовательну
функцію

печінки та депураційну функцію нирок. Має спазмолитическим,
противоспалительним і антибактеріальним дією.

Фармакокінетика. Дослідження фармакокінетичних властивостей
препарату не
проводилось.

Показані до застосування. Профілактика і комплексне лікування
воспалительних захворювань нирок і мочевиводящих шляхів, які
супроводжуються зменшенням мочевинообразовательної та азотовидільної
функцій,
мочекаменної хвороби, набрятків.

Способи застосування та дози. 2 столові ложки сировини заварити в 500 мл
киплячої,

настояти в закритій посуді протягом 1 години, процідити. Дорослим і
дітям після

7 років, виконайте в теплом вигляді по 2/3 склянки (150 мл) за 20 - 30
хвилин до їди 3 рази

в день.

2 фільтр-пакетики залити 150 мл кип'яченої, настояти в закритій посуді
в ході

15 хвилин. Дорослим і дітям після 7 років, процідити в теплом вигляді по
150 мл за 20 -

30 хвилин до їди 3 рази в день.

Курс лікування склався в середньому 2 місяці. Рекомендуються два
двомісячних

курсів з інтервалом 3 - 4 тижні.

Побочне дію. Можливі алергічні реакції.

Противопоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів
препарату. Дітський вік до 7 років.

Передозування. Не встановлено.

Особливості застосування. Приміщення препарату в періоді вагітності і

годування груддю можливо, якщо польська мова від прикладу переважає потенційний

ризик.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Нежелательное

взаємодія з іншими лікарськими засобами показувати невідомо.

Умовля і термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла

і недоступне для дітей місці при температурі 15 - 25 °C

С. Термін годності - 2 роки.

Лікарський препарат не слід застосовувати після істинування терміну годності,

вказанного на упаковці.

Умовля відходу. Без рецепта.

Упаковка. По 100 г збору в поліетиленовому пакеті, вкладеному в картонну

пачку; по 100 г збору в пачці на основі алюмінієвої фольги; по 100 г збору в пакетах

«Дой-пак»; по 1,5 г в фільтр-пакети №20.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія

«ЭЙМ».

Адрес. Україна, 61091, г. Харків, ул. Харківських дивізій, 20.

Заместитель директора

Державне фармакологічне

центр МЗ України В.Г. Лізогуб