

## Склад

*діюча речовина:* bismuth tribromophenate;

1 контейнер містить вісмуту трибромфеноляту (ксероформу) 7 г;

1 флакон полімерний з насадкою містить вісмуту трибромфеноляту (ксероформу) 10 г.

## Лікарська форма

Порошок нашкірний.

*Основні фізико-хімічні властивості:* аморфний порошок жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.

## Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

## Фармакологічні властивості

Вісмуту трибромфенолят (ксероформ) має антисептичні, в'яжучі та підсушуючі властивості. Дія препарату полягає у взаємодії з білками тканин із утворенням альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація) та інгібуванні ферментів; взаємодія з білками мікроорганізмів пригнічує їхню життєдіяльність.

## Показання

Як в'яжучий, підсушуючий та антисептичний засіб при запальних захворюваннях шкіри.

## Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість.

## Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена.

## Особливості застосування

Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Немає даних щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю, тому препарат слід призначати тільки тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

## Спосіб застосування та дози

Застосовують зовнішньо. Порошок наносять на уражені ділянки шкіри. Термін лікування залежить від перебігу захворювання та встановлюється лікарем індивідуально.

*Діти.*

Ефективність і безпека при застосуванні препарату дітям не встановлені. З цієї причини його застосування можливе тільки під наглядом та за призначенням лікаря.

**Передозування**

Дані відсутні.

**Побічні реакції**

Не відзначалися.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.

**Термін придатності**

5 років.

**Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище +30 °С в недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 7 г порошку в контейнері.

По 10 г порошку у флаконі полімерному з насадкою, по 1 флакону полімерному у коробці з картону.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.