

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.07.2017 № 760
Реєстраційне посвідчення
№ UA/6659/01/01
Зміни внесено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
21.11.2019 № 2319

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ
(за Вишневським)

Склад:

діючі речовини: 1 г лініменту містить ксероформу 30 мг, дьогтю березового 30 мг;
допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова.

Лікарська форма. Лінімент.

Основні фізико-хімічні властивості: однорідна маса від світло-жовтого до бурого кольору, з сіруватим або зеленуватим відтінком, зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезинфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика.

Бальзамічний лінімент за Вишневським чинить дезинфікуючу, протизапальну, слабку подразнювальну дію на рецептори тканин завдяки компонентам, що входять до його складу. Препарат сприяє прискоренню процесу загоєння ран, нормалізуючи кровопостачання тканин.

Клінічні характеристики.

Показання.

Абсцеси, фурункули, пролежні, лімфаденіти, лімфангіти, опіки, відмороження, трофічні виразки.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до фенолу та його похідних; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні на тих же ділянках шкіри з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

Особливості застосування.

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Перед накладанням пов'язки рану слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.

Не слід допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Руки після нанесення засобу слід ретельно вимити для запобігання потрапляння залишків мазі в очі, ніс, рот. У разі потрапляння – промити великою кількістю води.

Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров'я погіршиться, або виникнуть будь-які небажані явища, необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого лікування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки безпеку застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали, призначати його слід з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Немає інформації щодо впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим лінімент застосовувати зовнішньо за призначенням лікаря. Наносити 2-3 рази на добу тонким шаром на уражені ділянки шкіри або накладати пов'язку у 5-6 шарів марлі, просякнutoї препаратом. Пов'язку фіксувати, змінювати 1 раз на 2-3 дні.

Перев'язки проводити до повного очищення інфікованої ділянки шкіри.

Тривалість курсу лікування – від 6 до 20 днів.

Діти.

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату цієї віковій категорії не вивчалися.

Передозування.

Можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т.ч. висипання, свербіж), що потребує проведення протиалергічної терапії.

Побічні реакції.

При тривалому застосуванні можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж, шкірні висипання, кропив'янка, набряки), що потребує проведення протиалергічної терапії. Можливі реакції фотосенсибілізації.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково проконсультуватися з лікарем щодо подальшого лікування.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С .

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

40 г у банках, 40 г у тубах, 40 г у тубах № 1.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Дата останнього перегляду.