

Дієти

Препарат застосовується для лікування дітей старше 3 років.
Співвідповідність та дози.
Різновідповідність дітей віком від 6 років до 12 років (1 таблетка зернистої форми), дітям віком від 3 до 6 років - 1 чайна ложечка (чайна ложечка - це приблизно розмір розміру дози).
Приймати 3 рази на добу в 15-20 хвилин до їжі або після годину після їжі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України

13.10.09 № 738

Реєстраційне посвідчення

№ ІІА/1932/01/01

У разі спірного початку застосування препарату відповісти за результат протягом 15 хвилин.

I Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

Курс застосування - 2-4 тижні.
Лікар може зменшувати частоту застосування та зменшувати курс лікування залежно від ступеня та тяжкості захворювання.

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Atropa belladonna D4 – 30 мг, Lobaria pulmonaria D4 – 30 мг, Kalium stibyltartaricum D4 – 30 мг, Kreosotum D5 – 30 мг, Cephaelis ipecacuanha D4 – 30 мг, Lobelia inflata D4 – 30 мг, Hyoscyamus niger D4 – 60 мг, Bryonia D4 – 60 мг;
допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма.

Таблетки.

Круглі, плоскі з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, із запахом креозоту, в окремих випадках, після зберігання, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протизапальну, відхаркувальну, бронхолітичну, протикашльову та імуномодулючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування.

Гострі, хронічні запальні та обструктивні захворювання дихальних шляхів, бронхіт, трахеїт, кашель курця, бронхіальна астма, плеврит.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Особливі застереження.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не можна застосовувати препарат.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Випадки негативного впливу невідомі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Діти.

Препарат застосовують для лікування дітей старше 3 років.

ЗАТВОРДЖЕНО

Науково-Медична Академія

Інститут фармакології

Способ застосування та дози.

Разова доза: дорослим та дітям віком від 6 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), дітям віком від 3 до 6 років – 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішути, розчинити у 20 мл (4 чайні ложки) кип'яченого води кімнатної температури та приймати разову дозу: 2 чайні ложки (залишки розчину зберігати у захищенному від світла місці при кімнатній температурі не більше однієї доби).

Приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди.

У разі гострого початку захворювання приймати разову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин.

Курс лікування – 2-4 тижні.

Лікар може зменшувати частоту прийому до 1-2 разів на добу та за необхідностю повторювати курс лікування через 2-3 тижні.

Передозування.

Не відзначалось.

Побічні ефекти.

В окремих випадках можуть виникати алергічні реакції внаслідок індивідуальної чутливості до фенолу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Закривати контейнер з таблетками негайно після застосування, захищати від вологи та нагрівання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

2024 р. (в обструйованій захворювання дієвістю таблетки бросять,

Протиковідмінні.

Гіпоцідемічні чутливість до будь-якого компонента препарату.

Особливі застереження.

Против: Містить фенол, тому підікстам з рідкісними сідловими формами інсептивності гемостаза, недостатністю ліквізи або синдромом глюкозу гемостазу-міцелаборії не можна застосовувати препарат.

Застосування у період гвізячості або грудного дружби.

Епінаджементу поганої якості молку немісмо.

Здатність підвищувати наявність ринків при порушеннях з функціями мікроциркуляції.

Невідома.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу