

Цисплатин Эбеве конц-т д/инф. 50 мг/100 мл

Инструкция по применению, противопоказания и состав

Последняя актуализация описания производителем 01.07.2002

Состав и форма выпуска

1 флакон с 20, 50 и 100 мл концентрата для приготовления инфузии содержит цисплатина 10, 25 и 50 мг соответственно; в коробке 1 флакон.

Фармакологическое действие

противоопухолевое.

Бифункционально алкилирует нити ДНК, вследствие чего подавляет биосинтез нуклеиновых кислот, приводя к гибели клетки, как первичных опухолей, так и метастазов.

Показания препарата Цисплатин-Эбеве

Злокачественные опухоли яичка, рак яичников, опухоли головы и шеи, рак шейки матки, остеогенная саркома и саркома мягких тканей, рак легкого, карцинома предстательной железы, лимфосаркома, меланома.

Противопоказания

Гиперчувствительность, поражения костного мозга, миелосупрессия, почечная недостаточность, нарушения слуха, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано (обладает эмбриотоксичностью и тератогенностью). На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Нарушения слуха, поражение почек, печени и ЦНС, тошнота, рвота, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, анафилактические реакции.

Взаимодействие

Несовместим с аминогликозидными антибиотиками и цефалоспорины.

Способ применения и дозы

В/в и в/а — 50–120 мг/м² поверхности тела в одной дозе или 50 мг/м² в первый и восьмой день лечения, или по 15–20 мг/м² ежедневно в течение 5 дней. Курс лечения может повторяться каждые 3–4 нед. В/а вводят через артериальный катетер; при опухоли головы и шеи — 30 мг, при остеосаркоме — 120–150 мг.

Литература

Vokes E.E. et al. Cisplatin, 5-fluorouracil, and high-dose oral leucovorin for advanced head and neck cancer. Cancer 63: 1048–1052, 1989.

Условия хранения препарата Цисплатин-Эбеве

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Цисплатин-Эбеве

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.