

Склад

- діючі речовини: 1 капсула містить: екстракту вербезини білої листя сухого (*Eclipta alba*) (3,55:1) (екстрагент вода) 70,4 мг; екстракту пікроризи курроа коріння та кореневищ сухого (*Picrorrhiza kurroa*) (3,57:1) (екстрагент вода) 28,0 мг; екстракту пасльону чорного плодів сухого (*Solanum nigrum*) (3,47:1) (екстрагент вода) 14,4 мг; екстракту цикорію звичайного насіння сухого (*Cichorium intybus*) (3,64:1) (екстрагент вода) 48,0 мг; екстракту солодки голої коріння та кореневищ сухого (*Glycyrrhiza glabra*) (3,57:1) (екстрагент вода) 56,0 мг; екстракту тамариксу гальського плодів сухого (*Tamarix gallica*) (3,57:1) (екстрагент вода) 28,0 мг; екстракту редьки посівної насіння сухого (*Raphanus sativus*) (3,47:1) (екстрагент вода) 14,4 мг; екстракту барбарису остистого плодів сухого (*Berberis aristata*) (3,54:1) (екстрагент вода) 42,4 мг; екстракту розторопші плямистої насіння та листя сухого (*Silybum marianum*) (3,57:1) (екстрагент вода) 56,0 мг; екстракту сферантусу індійського плодів сухого (*Sphaeranthus indicu*) (3,47:1) (екстрагент вода) 14,4 мг; екстракту берхавії розлогої листя сухого (*Boerhavia diffusa*) (3,57:1) (екстрагент вода) 28,0 мг;
- допоміжна речовина: тальк.

Протипоказання

- підвищена чутливість до компонентів препарату;
- період вагітності;
- порушення функції нирок;
- артеріальна гіпертензія;
- гіпокаліємія;
- тяжкий ступінь ожиріння;
- органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда);
- гострі отруєння різної етіології.

Спосіб застосування

Дорослим призначати по 1-2 капсули 2 рази на добу після їди.

Курс лікування становить мінімум 2 тижні.

Лікування має тривати до зникнення ознак захворювання та нормалізації рівня ферментів.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Особливості застосування

При наявності конкрементів у жовчовивідних шляхах слід вирішувати питання щодо доцільності застосування препарату, залежно від розмірів конкрементів (за даними ультразвукового дослідження).

Вагітні

Препарат протипоказаний у період вагітності.

Діти

Не застосовувати дітям.

Водії

Не впливає.

Передозування

Симптоми: нудота, блювання, слабкість. Лікування симптоматичне.

Тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу (включаючи гіпокаліємію).

Побічні ефекти

У поодиноких випадках можуть виникати алергічні реакції, у том числі свербіж, шкірні висипання, гіперемія шкіри, ангіоневротичний набряк, задишка; а також посилення діурезу; диспептичні явища, нудота, блювання, діарея, порушення водно-електролітного балансу (поява набряків), підвищення артеріального тиску.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.