

# Де-нол

## Склад

Діюча речовина препарату Де-нол - вісмуту субцитрат колоїдний.

## Фармакологічні властивості

Де-нол - противиразковий препарат, до складу якого входить вісмуту субцитрат. Потрапляючи в шлунок, Вісмут субцитрат колоїдний, на поверхні виразок і ерозій утворює захисну від кислого середовища плівку, при цьому збільшується синтез простагландину E<sub>2</sub>, який стимулює синтез шлункового слизу і бікарбонатів. Разом ці процеси призводять до загоєння і рубцюванню в шлунку і дванадцятипалої кишки.

Препарат має бактерицидну дію до бактерії *Helicobacter pylori*.

## Показання

- виразка шлунка і дванадцятипалої кишки;
- хронічний гастрит;
- в комплексній терапії *Helicobacter pylori*.

## Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 120 мг №56, №112 у блістерах.

## Спосіб застосування

Приймати за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води. Дорослі та діти від 14 років: по 1 таблетці 4 рази на день або по 2 таблетки 2 рази на добу. Діти від 8 до 14 років: по 1 таблетці 2 рази на день. Діти від 4 до 8 років: добова доза розраховується по вазі дитини - 8 мг на 1 кг маси на добу, але не більше 2 таблеток на добу. Курс лікування від 4 до 8 тижнів, далі необхідна перерва в прийомі не менше 2 місяців. У терапії *Helicobacter pylori* слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Препарат Де-нол можна застосовувати дітям від 4 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю: вагітним і годуючим не рекомендується приймати препарат Де-нол.

## Особливості по застосуванню

При прийомі препарату Де-нол, можливе фарбування калу в чорний колір - в такому випадку потрібна додаткова консультація лікаря.

Прийом антацидів або молока за 30 хвилин до і після їжі, нейтралізує шлунковий сік і як наслідок зводить ефективність Вісмуту субцитрат колоїдного практично до нуля.

Не рекомендується тривалий прийом високих доз препаратів вісмуту, оскільки в окремих випадках можливо виникнення зворотної енцефалопатії. При дотриманні дозування ризик виникнення цього побічного ефекту дуже малий.

### **Протипоказання**

- підвищена чутливість до вісмуту субцитрат колоїдного або допоміжних речовин;
- тяжка ниркова недостатність.

### **Побічні ефекти**

Забарвлення калу в чорний колір, нудота, блювота, запор, діарея, висип або свербіж на шкірі, анафілактичні реакції.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

Перед прийомом препарату не слід вживати антациди, молоко, фрукти, соки.

Одночасне застосування препаратів, що містять вісмут, підвищує ризик збільшення концентрації вісмуту в крові.

Вісмуту субцитрат колоїдний зменшать всмоктування антибіотиків ряду тетрацикліну.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Немає даних щодо впливу препарату Де-нол на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

### **Передозування**

Гостре передозування може призвести до ниркової недостатності з відстрочкою в прояві симптомів до 10 днів.

**Лікування:** після разового прийому високої дози потрібно промити шлунок, далі приймати активоване вугілля і осмотичні проносні засоби.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 ° C, в недоступному для дітей місці.

### **Категорія відпустки**

Без рецепта.

Інструкція препарату Де-нол представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Де-нолу з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!