

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.05.2018 № 942
Реєстраційне посвідчення
№ UA/8278/01/01

Зміни внесено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.12.2019 № 2446

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ДУБА КОРА
(QUERCUS CORTEX)

Склад:

діюча речовина: дуба кора (*quercus cortex*);
1 пачка містить дуба кори (*quercus cortex*) 50 г або 100 г.

Лікарська форма. Кора.

Основні фізико-хімічні властивості: висушені, жолобчасті та зморщені шматочки кори свіжозаготованих молодих пагонів товщиною до 6 мм, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Зовнішня поверхня світло-сірого або зеленувато-сірого кольору, частіше гладенька, зрідка із сочевичками. Внутрішня поверхня блідо-коричневого або червонувато-коричневого кольору із дещо рельєфними подовжніми борозенками. Злам заїдливий і волокнистий. Запах слабкий, своєрідний, посилюється при змочуванні кори водою. Смак сильно в'язучий.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Біологічно активні речовини препарату чинять в'язучу, протизапальну, протигнильну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Стоматити, гінгівіти, парадонтози, фарингіти, трахеїти та інші запальні захворювання ротової порожнини і горла (у комплексній терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дуба кору призначає лікар, і тільки тоді, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв, після чого негайно процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед застосуванням відвар збовтати.

Застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 6-8 разів на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовують дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г або 100 г у пачках із внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова 16.

Дата останнього перегляду.