

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.08.2017 № 944
Реєстраційне посвідчення
№ UA/6734/01/01

Зміни внесено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.11.2020 № 2669

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ЕТОНІЙ

Склад:

діюча речовина: 1 г мазі містить етонію 10 мг;

допоміжні речовини: ланолін, парафін білий м'який, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса світло-жовтого кольору.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Сполуки четвертинного амонію. Код ATХ D08A J.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Етоній чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію, зумовлену порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стрептококів, стафілококів. Чинить також легку місцевоанестезуючу і ранозагоювальну дію. Сприяє регенерації пошкоджених тканин. Чинить детоксикуючу дію щодо стафілококового токсину.

Клінічні характеристики.

Показання.

Трофічні виразки шкіри, тріщини соків, прямої кишki та промежини, вагініт, опіки (термічні, хімічні, променеві та слизових оболонок), рентгенівські дерматити.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату (алергічний дерматит, екзема); алергічні реакції на компоненти препарату, гнійні і гангренозні форми пульпітів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з антибіотиками групи тетрациклінів, гентаміцином сульфатом, левоміцетином посилюється дія антибіотиків.

Особливості застосування.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Застосування у період вагіності або годування груддю.

Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату у період вагіності є ризикованим. Протягом вагіності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.

При застосуванні для лікування тріщин соків у період годування груддю препарат слід змити перед годуванням.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо.

Для лікування трофічних виразок і опіків препарат наносять безпосередньо на ушкоджену поверхню і накладають стерильну пов'язку або мазь накладають на пов'язку, а потім її – на рану. Препарат наносять на уражені ділянки шкіри дорослим 1-2 рази на добу. Тривалість курсу лікування – від 3 днів до 1 місяця.

Діти.

Досвід застосування Етонію дітям відсутній.

Передозування.

Інформація про передозування відсутня.

Побічні реакції

Можливі гіперемія шкіри, свербіж, алергічні реакції.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 15 г у банках № 1 або тубах № 1.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Дата останнього перегляду.