

ФітоСтатин®

Склад: 1 таблетка містить: активний інгредієнт: полікозанол – 10 мг або 20 мг, або 40 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (Е 460), натрію крохмаль гліколят, двоокис кремнію колоїдний гідрофобний та водний, стеарат магнію (Е 470); оболонка таблетки (*Opadry White*): гідроксипропілметилцелюлоза (Е 464), гідроксипропілцелюлоза (Е 463), титану двоокис (Е 171), тальк (Е 553), вода очищена.

Рекомендації щодо споживання: рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело полікозанолу – природної суміші вищих первинних аліфатичних спиртів (І-тетракозанолу, І-гексакозанолу, І-гептакозанолу, І-октакозанолу, І-триаконтанолу), одержаних шляхом екстракції із цукрової тростини (*Saccharum officinarum*) з метою нормалізації рівня загального холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) в сироватці крові і поліпшення функціонального стану серцево-судинної системи; має антиоксидантні та гіпохолестеринемічні властивості; запобігає надмірній агрегації (клейкості) тромбоцитів, не впливаючи при цьому на показники коагуляції крові.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 таблетці 1 раз на добу під час вечері (оскільки біосинтез холестерину активізується в нічний час), запиваючи питною водою. Рекомендована початкова добова доза – 10 мг. У разі необхідності, за рекомендацією лікаря, через 2 місяці рекомендована добова доза може складати від 20 мг до 40 мг на добу. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.

Особливості застосування: В період застосування ФітоСтатину® необхідно дотримуватися низькокалорійного раціону харчування з обмеженням вживання жирів тваринного походження та контролювати

рівень холестерину в сироватці крові через кожні 2 місяці.

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендованої добової дози.

Протипоказання: вагітність та період лактації, індивідуальна несприйнятливості компонентів.

Добавка дієтична на основі екстракту із рослинної сировини. Не є лікарським засобом.

Форма випуску: таблетки №10 у блистері з послідуочим пакуванням в кількості від одного до десяти в картонну пачку; чи до ста штук в коробки. Таблетки №365 у контейнерах з полімерних матеріалів.

Маса нетто 1 таблетки: 166 мг ± 7,5%, 332 мг ± 7,5% або 664 мг ± 7,5%.

Дата виготовлення та строк придатності: дату виготовлення вказано на упаковці. Строк придатності – 2 роки з дати виготовлення.

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25°C у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Назва (найменування), повна адреса і телефон виробника: ТОВ «ОмніФарма», Україна, м. Київ, вул. Леніна, 55, 02088; тел./факс: (044) 577-57-37 (38,39).

www.omnifarma.kiev.ua

Адреса потужностей (об'єкта) виробництва (місцезнаходження): 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд. 8.

Штрих-код: вказано на упаковці.

ТУ У 10.8-35758392-003:2012

ФитоСтатин®

Состав: 1 таблетка содержит: активный ингредиент: поликозанол – 10 мг или 20 мг, или 40 мг; вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (Е 460), натрия крахмал гликолят, диоксид кремния коллоидный гидрофобный и водный, стеарат магния (Е 470); оболочка таблетки (*Opadry White*): гидроксипропилметилцеллюлоза (Е 464), гидроксипропилцеллюлоза (Е 463), титана диоксид (Е 171), тальк (Е 553), вода очищенная.

Рекомендации по применению: рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник поликозанола – природной смеси высших первичных алифатических спиртов (I-тетракозанола, I-гексакозанола, I-гептакозанола, I-октакозанола, I-триаконтанола), полученных путем экстрагирования из сахарного тростника (*Saccharum officinarum*) с целью нормализации уровня общего холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) в сыворотке крови и улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы; обладает антиоксидантными и гипохолестеринемическими свойствами; предотвращает избыточную агрегацию (клейкость) тромбоцитов, не влияя при этом на показатели коагуляции крови.

Способ применения и рекомендованная суточная доза: применять взрослым по 1 таблетке 1 раз в сутки во время ужина (поскольку биосинтез холестерина активизируется в ночное время), запивая питьевой водой. Рекомендованная начальная суточная доза – 10 мг. В случае необходимости, по рекомендации врача, через 2 месяца рекомендованная суточная доза может составлять от 20 мг до 40 мг в сутки. Курс применения определяет врач индивидуально. Перед началом применения рекомендуется консультация врача.

Особенности применения: В период применения ФитоСтатина® необходимо придерживаться низкокалорийного рацио-

на питания с ограничением употребления жиров животного происхождения и контролировать уровень холестерина в сыворотке крови через каждые 2 месяца.

Ограничения по применению: не превышать рекомендованную суточную дозу.

Противопоказания: беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов.

Добавка диетическая на основе экстракта из растительного сырья. Не является лекарственным средством.

Форма выпуска: таблетки №10 в блистере с последующей упаковкой в количестве от одного до десяти в картонную пачку; или до ста штук в коробки. Таблетки №365 в контейнерах из полимерных материалов.

Масса нетто 1 таблетки: 166 мг ± 7,5%, 332 мг ± 7,5% или 664 мг ± 7,5%.

Дата изготовления и срок годности: дата изготовления указана на упаковке. Срок годности – 2 года с даты изготовления.

Номер партии (серии) производства: указан на упаковке.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Название (наименование), полный адрес и телефон производителя: ООО «ОмниФарма», Украина, г. Киев, ул. Ленина, 55, 02088; тел./факс: (044) 577-57-37 (38,39);

www.omnifarma.kiev.ua

Адрес мощностей (объекта) производства (местонахождение): 03124, г. Киев, бульвар Ивана Лепсе, д. 8.

Штрих-код: указан на упаковке.

ТУ У 10.8-35758392-003:2012