

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.02.12 № 127
Реєстраційне посвідчення
№ UA/14268/02/01

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ГРИП-ХЕЕЛЬ
(GRIPP-HEEL[®])

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Aconitum napellus D4 – 120 мг, Bryonia D4 – 60 мг, Eupatorium perfoliatum D3 – 30 мг, Lachesis D12 – 60 мг, Phosphorus D5 – 30 мг;
допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Круглі плоскі з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, можливі темні та жовті вкраплення, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ.
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат має дезінтоксикаційну, протизапальну, імунокоригуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні та профілактиці грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій; інфекційних та гострих запальних захворювань, які супроводжуються інтоксикацією.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносямості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної малабсорбції не слід застосовувати препарат.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану, у випадку задишки, гнійної мокроти, гарячки чи болю при диханні необхідно проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування). Приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.
Курс лікування – 5-10 діб.

Після зникнення симптомів захворювання рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу ще протягом 5-7 днів з метою профілактики ускладнень.

З метою профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у осінньо-зимовий період приймати разову дозу 1 раз на добу (вранці), у період епідемії грипу – 2 рази на добу (вранці та ввечері).

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках в осіб з індивідуальною непереносимістю можливе виникнення реакцій гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, гіперемію, шкірні висипання, свербіж.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу