

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
д. 12. 11 № 939

Реєстраційне посвідчення
№ УА 111860/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АЛТЕЙКА СИРОП

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 5 мл сиропу містять алтейного кореня екстракту сухого у перерахунку на полісахариди 7,5 мг;
допоміжні речовини: метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), етанол 96 %, цукор, вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Сиропоподібна рідина від світло-коричневого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається наявність осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віоля».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код ATC R05C A05.

Відхаркувальний засіб прямої дії. Рослинний препарат, який містить алтейного кореня екстракт сухий, основними біологічно активними речовинами якого є полісахариди, а також пектини, амінокислоти, крохмаль та інші. Полісахариди препарату всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом'якшуочу і протизапальну дію, дещо збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізуючи її реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність). Підсилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння. Рослинний полісахаридний слиз препарату, обволікаючи слизову оболонку шлунка, виявляє цитопротективний і протизапальний ефекти.

Показання для застосування.

Комплексне лікування гострих і хронічних запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма, коклюш.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря.

Особливі застереження.

Препарат містить цукор, тому його не застосовують хворим на цукровий діабет.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат містить 2 % етанолу (1 мл сиропу містить 0,02 мл етанолу), тому дітям віком до 6 років перед прийомом сироп розводять у кип'яченій воді.

Способ застосування та дози.

Перед застосуванням збовтувати. Препарат призначають до їди: дорослим та дітям віком від 14 років по 1 столовій ложці сиропу 4 - 6 разів на добу.

Дітям віком від 6 до 14 років препарат призначають по 1 десертній ложці (10 мл) 4 - 6 разів на добу.

Дітям віком до 6 років необхідну кількість сиропу розводять у невеликій кількості кип'яченої води (10 - 15 мл, або 2 - 3 чайні ложки):

від 2 до 6 років – по 5 мл сиропу 4 - 6 разів на добу;

від 1 до 2 років – по 2,5 мл 3 - 4 рази на добу;

дітям віком до 1 року – по 2,5 мл 1-2 рази на добу.

Тривалість курсу терапії визначається індивідуально, залежно від ефективності лікування і, як правило, становить 7 - 14 днів.

Передозування.

Випадки передозування не описані.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування і звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашлювими засобами (наприклад кодейном).

Термін придатності.

18 місяців.

Умови зберігання.

Зберігати в захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі 4-8 °C.

Упаковка.

По 100 мл або 200 мл у скляних або полімерних флаконах у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецептів.**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє та достовірно відомими даними щодо застосування лікарського засобу