

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
29.12.12 № 1136
Реєстраційне посвідчення
№ УА/2118/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

БАГНА ЗВИЧАЙНОГО ПАГОНИ
(CORMUS LEDI PALUSTRIS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: багна звичайного пагони.

Лікарська форма. Пагони.

Шматочки стебел, листків та плодів різноманітної форми. Колір зелений, темно-зелений, оранжево-коричневий, сірувато-коричневий. Запах різкий, специфічний. Сmak не визначається.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код ATC R05C A.

Пагони багна містять глікозид арбутин, флавоноїди, дубильні речовини, ефірну олію (до 7,5 %). До складу олії входять сесквітерпеноїди, ледол, палюстрол, цимол, геранілацетат. Завдяки наявності цих речовин препарати з багна звичайного мають спазмолітичні, відхаркувальні, потогінні, сечогінні, дезинфікуючі та заспокійливі властивості, розширяють судини і знижують артеріальний тиск, підвищують тонус гладеньких м'язів.

Показання для застосування.

Як відхаркувальний та протикашльовий засіб у складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів (бронхітів, трахеїтів, ларингітів, коклюшу), бронхіальної астми.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів рослинної сировини. Підвищена збудливість.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності, оскільки має збуджувальні властивості і впливає на м'язи матки, підвищуючи її тонус. Застосовувати препарат у період годування груддю можна лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не описана.

Діти.

Багно звичайне є отруйною рослиною. Через неможливість його точного дозування, дітям віком до 12 років препарат не слід застосовувати.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки (10 г) пагонів покласти в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити кришкою і нагріти у киплячій воді (на водяній бані) 15 хвилин, охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити. Сировину, що залишилася, віджати до процідженого настою, і об'єм настою довести кип'ячену водою до початкового об'єму 200 мл. Дорослим та дітям віком від 12 років приймати внутрішньо теплим по 1/4 склянки 2-3 рази на добу після їди.

Термін лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від перебігу захворювання, його вираженості, характеру комплексної терапії. Настій перед вживанням збовтати.

Передозування.

Великі дози можуть привести до надмірного збудження, а в тяжких випадках - до пригнічення центральної нервової системи.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи висипання на шкірі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні може посилювати ефект снодійних засобів та засобів, що пригнічують центральну нервову систему. Не слід застосовувати разом із препаратами, що пригнічують кашель.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °C) місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пакетах, вкладених у пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу