

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу

СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить сірки 0,333 г;

*допоміжні речовини:* парафін жовтий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь жовтого або світло-жовтого кольору, без запаху. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку.  
Код АТХ D10A B02.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Лікарський засіб чинить протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіді і пентатіонова кислота, що мають антисептичну дію.

*Фармакокінетика.* При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

У складі комбінованої терапії шкірних захворювань – себореї, сикозу, псоріазу, мікозу, корости.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік до 3 років.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія мазі з окиснювачами (водню пероксиду розчин, калію перманганат) може призвести до хімічного опіку. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

**Особливості застосування.**

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.



*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

**Спосіб застосування та дози.**

Лікарський засіб застосовувати зовнішньо.

Дорослим та дітям віком від 3 років мазь наносити на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на день.

При лікуванні корості схема застосування препарату і вимоги дотримання правил особистої гігієни визначаються індивідуально.

Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

**Діти.**

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років. При лікуванні дітей віком від 3 до 12 років мазь можна застосовувати за рекомендацією лікаря після оцінки співвідношення ризик/користь.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні реакції.**

Алергічні реакції.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 г у тубі у пачці з картону або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, [www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)

**Дата останнього перегляду.**

*С.Чем*  
*lw*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

*Текст узгоджено*  
*07.05.2018р.*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

