

Функціональні властивості компонентів дієтичної добавки «ЛАКТАКОЛ®»

Разова доза 0,5 мл (ml) містить: Лактази (β -галактозидази) - 700 ALU.

Склад:

у флаконі: соняшникова олія, вітамін E;

у кришці: лактаза (β -галактозидаза), антизлежувачі: целюлоза, магнію стеарат.

Без ГМО.

Рекомендації до споживання: дієтична добавка ЛАКТАКОЛ® може бути рекомендована для включення в раціон харчування дітей від народження як додаткове джерело ферменту лактази при несприйнятливості до молока, яка обумовлена фізіологічним дефіцитом лактази, яка розщеплює молочний цукор (лактозу) при годуванні немовлят з моменту народження до 4 місяців, або з метою підтримки нормального функціонального стану шлунково-кишкового тракту при станах, що супроводжуються підвищеним газоутворенням і здуттям живота.

Властивості складових:

Лактоза (молочний цукор) – це природний цукор, який міститься в багатьох харчових продуктах, найбільш поширені з яких: молоко (грудне, коров'яче, козяче) і молочні продукти (йогурти, кефіри, сирки, деякі молочні суміші і каші), а також інші продукти харчування.

Непереносимість лактози (молочного цукру) є харчовою непереносимістю, тобто, коли лактоза (молочний цукор), спожита з харчовими продуктами, не засвоюється або засвоюється тільки частково. Причиною цього є знижений або відсутній синтез в організмі ферменту лактази, який зазвичай утворюється в тонкому кишечнику. Даний травний фермент розщеплює лактозу у процесі травлення на два моносахариди – галактозу і глюкозу (виноградний цукор). Якщо цього не відбувається, то лактоза у незміненому вигляді потрапляє до товстого кишечника і зброджується кишковими бактеріями, внаслідок чого утворюються метан і вуглекислий газ, які спричиняють здуття, бурчання в животі, пронос, кишкові коліки.

Лактаза, що входить до складу Лактакол® виконує ферментативну функцію по розщепленню лактози при недостатньому або відсутньому природному синтезі в ентероцитах тонкої кишки. Таким чином, якщо є проблеми з перетравлюванням лактози, лактаза поліпшує її засвоєння й усуває побічні реакції, що виникають при вищезгаданих порушеннях функціонального стану.

Токоферол (вітамін E) – активний антиоксидант, який справляє антиокисну дію на внутрішньоклітинні ліпіди та охороняє їх від пероксидації.

Соняшникова олія – рослинна олія, до складу якої входять цінні для організму поживні речовини, а також вітаміни груп A, D, E і F.

Застереження до споживання: Не рекомендується при підвищеній чутливості до складових компонентів.

ЛАКТАКОЛ® не призначений для лікування, не повинен застосовуватися як заміна повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендованої добової дози. Перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживайте після закінчення строку

придатності. ЛАКТАКОЛІР є ферментом, який руйнується під впливом температури, тому його не слід додавати до гарячої їжі або рідини.

Не слід використовувати з надто гарячим або холодним молоком.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова доза: рекомендовано немовлятам з моменту народження до 3-4 місяців. Перед використанням натиснути на ковпачок та добре збовтати, за допомогою піпетки набрати 0,5 мл (ml) розчину та давати немовляті перед кожним годуванням або додати до харчової суміші, грудного молока, (дивись піктограму на дні коробки). Добова потреба в продукті індивідуальна і залежить від віку, маси тіла і стану здоров'я немовляти (від народження). Добова доза дієтичної добавки визначається і контролюється лікарем. Перед вживанням флакон необхідно збовтати.

Термін споживання: тривалість споживання узгоджувати з лікарем.

Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати зазначеної на упаковці; термін придатності – 24 місяці від дати виробництва.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, подалі від нагрівання, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакону зберігати не більше 5 днів при температурі не вище 25 °С.

Форма випуску: оральний розчин по 8 мл (ml) у флаконі; по 5 флаконів з піпеткою та змінною кришкою у картонній пачці.

Найменування виробника: Erbozeta S.p.A., Strada delle Seriole 41/43, 47894 Chiesanuova (RSM), Республіка Сан Марино
на замовлення Pharmunion LLC, 3524 Silverside Road, Suite 35B, Wilmington, Delaware, 19810, США.

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ «АСІНО УКРАЇНА», 03124, Україна,

м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, тел.: +38 (044) 281-23-33.

EZ 00.53.63