

Метилурацил супозиторії рект. по 0.5 г №10

Склад:

Діюча речовина: метилурацил;

1 супозиторій містить метилурацилу 0,5 г;

Допоміжна речовина: твердий жир.

Лікарська форма:

Супозиторії ректальні.

Основні фізико-хімічні властивості:

Супозиторії білого або білого з жовтуватим або кремовим відтінком кольору.

Фармакотерапевтична група:

Нестероїдні анаболічні засоби. Код АТХ А14В.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.

Препарат має анаболічну та антикатаболічну дію. Прискорює регенерацію, загоєння ран, стимулює клітинні і гуморальні ланки імунітету, чинить протизапальну дію. Характерною специфічною властивістю препарату є стимулюючий вплив на еритро- і, особливо, лейкопоез.

Фармакокінетика.

При введенні супозиторія у пряму кишку препарат добре і майже повністю всмоктується через слизову і виявляється в крові через 20–30 хв. Максимальна концентрація в крові досягається через 1–2 години. Виводиться з організму переважно нирками у вигляді метаболітів і кон'югатів і частково з калом у незміненому вигляді.

Показання:

Запально-виразкові захворювання нижніх відділів товстого кишечника: ерозивно-виразкові коліти, проктосигмоїдити, тріщини заднього проходу.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до метилурацилу або до інших компонентів препарату. Препарат протипоказаний при гострих та хронічних (зазвичай мієлоїдних) формах лейкозу, лімфогранулематозі, злоякісних захворюваннях кісткового мозку.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:

Метилурацил посилює дію строфантину, підвищує ефективність дії антибіотиків та сульфаніламідних препаратів.

Особливості застосування:

Метилурацил доцільно призначати при легких формах лейкопенії. При захворюванні середнього ступеня тяжкості препарат приймати тільки після відновлення порушень регенерації клітин крові. При тяжких формах ураження кровотворення метилурацил не призначати.

Застосування у період вагітності або годування груддю:

Препарат не застосовують у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами:

Доки не буде з'ясована індивідуальна реакція пацієнта на препарат, слід утримуватись від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, враховуючи, що під час лікування метилурацилом можливі такі побічні реакції з боку нервової системи, як запаморочення.

Спосіб застосування та дози:

Супозиторій звільнити від контурної упаковки і вводити ректально. Дорослим і дітям з 14 років по 1 супозиторію 1–4 рази на добу. Курс лікування – від 7 днів до 4 місяців залежно від характеру захворювання.

Діти.

Препарат не застосовувати для лікування дітей віком до 14 років.

Передозування:

Не спостерігалось.

Побічні реакції:

- З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення.
- З боку шкіри і підшкірної клітковини: алергічні реакції, у тому числі гіперемія, свербіж, висипи на шкірі, кропив'янка.
- Зміни у місці введення: при введенні супозиторія у пряму кишку інколи відчувається короточасне печіння, свербіж.

Термін придатності:

2 роки.

Умови зберігання:

В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка:

По 5 супозиторіїв у стрипі. По 2 стрипи у пачці з картону.

Категорія відпуску: Без рецепта.

Без рецепта.

Виробник: Монфарм, Україна

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Метилурацилу супозиторіїв з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!