

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МЕТРО-АДНЕКС-ІН'ЄЛЬ
(METRO-ADNEX-INJEEL)

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл містить Apis mellifica D10 – 1,1 мг, Apis mellifica D30 – 1,1 мг, Apis mellifica D200 – 1,1 мг, Lachesis mutus D10 – 1,1 мг, Lachesis mutus D30 – 1,1 мг, Lachesis mutus D200 – 1,1 мг, Lachesis mutus D1000 – 1,1 мг, Lilium lancifolium D10 – 1,1 мг, Lilium lancifolium D30 – 1,1 мг, Lilium lancifolium D200 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D10 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D30 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D200 – 1,1 мг, Lycopodium clavatum D1000 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D10 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D30 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D200 – 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D10 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D30 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D200 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D1000 – 1,65 мг, Vespa crabro D10 – 1,65 мг, Vespa crabro D30 – 1,65 мг, Vespa crabro D200 – 1,65 мг, Cimicifuga racemosa D10 – 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D30 – 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D200 – 2,2 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання.

Аднексит; параметрит, ендометрит; вагініт; дисменорея; міжменструальний біль; клімактеричний невроз.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дівчатам пубертатного віку – 1 ампула по 1,1 мл.

Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних (в акупунктурні точки), внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій або перорально (розчинити разову дозу в 50 мл води та випити протягом доби) 1-3 рази на тиждень.

У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можуть виникати алергічні реакції або підвищене слиновиділення внаслідок індивідуальної чутливості до гомеопатичної діючої речовини Hydrargyrum bichloratum (ртуть), у такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Передозування.

Не відзначалось.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Випадки негативного впливу невідомі.

Діти.

Препарат рекомендований для застосування, починаючи з періоду статевого дозрівання.

Особливості застосування.

Відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат чинить протизапальну, антиексудативну, дезінтоксикаційну, імунокоригуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Несумісність. Відсутня.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ.

Місцезнаходження.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу