

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

10.08.12 № 629

Реєстраційне посвідчення

№ UA/2268/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**СОСНИ БРУНЬКИ**  
(GEMMAE PINI)

**Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: сосни бруньки.

**Лікарська форма.** Бруньки.

Бруньки (укорочені верхівкові пагони) поодинокі або по кілька штук у мутовках, які оточують більшу велику центральну бруньку, без стебла або із залишками стебла, довжиною не більше 3 мм. Поверхня бруньок вкрита сухими, розташованими по спіралі ланцетовидними, загостреними торочковидними лусками, склеєними між собою смолою, що виступає.

Колір зовні рожевувато-бурий, на зломі зелений або бурий. Довжина бруньок – 1-4 см. Запах приємний, смолистий. Сmak гіркуватий.

**Назва і місце знаходження виробника.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код ATC R05C A.

Біологічно активні речовини препарату стимулюють секреторну активність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, чинять відхаркувальну дію, діють бактерицидно на патогенну мікрофлору носоглотки і ротової порожнини, а також слабкі сечогінні та потогінні властивості.

**Показання для застосування.**

Захворювання дихальних шляхів (хронічні бронхіти, пневмонії); зовнішньо – при ларингітах, трахеїтах, ангіні (у складі комплексної терапії).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Нефрити, нефрози, піеліти, гломерулонефрити, гепатити, нефропатії вагітних, бронхіальна астма.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Протипоказане застосування внутрішньо (може спровокувати ураження нирок).

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Препарат застосовують дітям від 3 років.

**Спосіб застосування та дози.**

2 столові ложки бруньок помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'ячену водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/3 склянки; дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці.

Підігрітий відвар застосовувати місцево для інгаляцій та полоскань.

Перед застосуванням препарат збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.**

Передозування та тривале застосування спричиняють запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри); альбумінурія, гематурія. При інгаляційному застосуванні можливий бронхоспазм.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15 °C) місці не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 50 г або 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу