

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

# Сульфокамфокаїн-Дарниця

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 мл розчину містить DL сульфокамфорної кислоти 49,6 мг, новокаїну основи 50,4 мг;

*допоміжна речовина:* вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Кардіологічні препарати. Код АТС С01Е В.

**Клінічні характеристики.**

Показання.

Гостра та хронічна дихальна недостатність; гостра серцева недостатність у геріатрії; пригнічення дихання при пневмонії та інших інфекційних захворюваннях; кардіогенний та анафілактичний шок; отруєння алкоголем, легкі форми отруєння снодійними засобами.

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до камфори, новокаїну або до інших компонентів препарату; епілепсія, схильність до судомних станів.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат призначати підшкірно, внутрішньом'язово або внутрішньовенно (повільно, струминно або краплинно) дорослим у разовій дозі 2 мл. Для розведення слід застосовувати 0,9 % розчин натрію хлориду. При необхідності препарат можна застосовувати 2-3 рази на добу. Максимальна добова доза для дорослих – 12 мл.

У гострих випадках препарат вводити внутрішньовенно.

При хронічній дихальній недостатності та серцевій недостатності препарат застосовувати внутрішньом'язово або підшкірно. Курс лікування може становити 20-30 днів.

**Побічні реакції.**

*З боку системи крові та лімфатичної системи:* метгемоглобінемія.

*З боку серцево-судинної системи:* зниження або підвищення артеріального тиску, відчуття серцебиття, біль в грудній клітці;

*З боку нервової системи:* головний біль, запаморочення, тремор, парестезії, судоми.

*З боку травної системи:* диспепсичні розлади.

*З боку імунної системи:* реакції гіперчутливості, в тому числі ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, шкірні висипання, свербіж, гіперемія, кропив'янка.

*Інші:* пропасниця, мимовільне сечовипускання.

### **Передозування.**

*Симптоми:* головний біль, запаморочення; при гострому отруєнні – почервоніння обличчя, патологічна рухова активність, марення, епілептиформні судоми.

*Лікування:* антипсихотичні та протисудомні засоби. При невираженому психомоторному збудженні – транквілізатори або заспокійливі засоби.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У доказовій медицині відсутня об'єктивна інформація про застосування Сульфокамфокаїну-Дарниця у період вагітності, тому вагітним препарат не застосовують. Не виключається можливість проникнення препарату у молоко у період годування груддю, тому при застосуванні препарату необхідно припинити грудне годування.

### **Діти.**

Препарат не застосовують дітям.

### **Особливості застосування.**

Застосовувати з обережністю пацієнтам з артеріальною гіпотензією (гіпотензивний вплив новокаїну).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Під час лікування слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та роботі зі складними механізмами, а у разі виникнення запаморочення, судом, утриматися від потенційно небезпечних видів діяльності, які вимагають підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами можливе:

*з препаратами, що пригнічують центральну нервову систему – послаблення дії останніх;*

*з антихолінестеразними засобами – послаблення дії останніх;*

*з суксаметонієм – пролонгація нервово-м'язової блокади, спричиненої суксаметонієм;*

*з інгібіторами MAO – підвищення ризику артеріальної гіпертензії;*

*із серцевими глікозидами, сечогінними засобами, аналгетиками, стероїдними гормонами – посилення аналептичної дії сульфокамфокаїну.*

Препарат іноді призначають для зменшення побічних ефектів при проведенні хіміотерапії 5-фторурацилом.

Під час застосування препарату не рекомендується вживати алкоголь.

### **Фармакологічні властивості.**

#### **Фармакодинаміка.**

Препарат Сульфокамфокаїн-Дарниця належить до групи аналептичних лікарських засобів. Механізм дії препарату обумовлений збудженням центральної нервової системи, у першу чергу центрів довгастого мозку як

безпосередньо, так і через сонний синус. Препарат тонізує дихальний і судинноруховий центри, підсилює обмінні процеси у серцевому м'язі, підвищуючи його чутливість до впливу симпатичних нервів. Сульфокамфокаїн-Дарниця впливає на судини – відбувається перерозподіл крові, звужуються судини органів черевної порожнини, підвищується тонус венозних судин, трохи збільшується приплив крові до серця, поліпшується коронарний кровотік, кровопостачання мозку та легенів. Кардіотонічний ефект пов'язаний з адреносенсибілізуючою дією, посиленням процесів дихання, пов'язаних із процесом фосфорилляції макроергічних з'єднань.

#### **Фармакокінетика.**

Препарат Сульфокамфокаїн-Дарниця швидко всмоктується при підшкірному, внутрішньом'язовому, внутрішньовенному введенні. В організмі у процесі метаболізму піддається окислюванню та кон'югації із глюкуроновою кислотою. Метаболіти виділяються в основному нирками, при цьому сеча має запах препарату. Частково виводиться з видихуванним повітрям, через дихальні шляхи та з жовчю.

#### **Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина.

**Термін придатності.** 3 роки.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

#### **Упаковка.**

По 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці; по 10 ампул у коробці.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

#### **Виробник.**

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

#### **Місцезнаходження.**

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

Інструкція препарату Сульфокамфокаїн-Дарниця представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Сульфокамфокаїн-Дарниця з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!