

# Віаль лайт краплі очні 0 5 мг мл 10мл

## Склад

*діюча речовина:* tetryzoline; 1 мл препарату містить тетрагідрозоліну гідрохлориду у перерахуванні на 100 % суху речовину 0,5 мг;

*допоміжні речовини:* бензалконію хлорид, кислота борна, натрію тетраборат, натрію хлорид, динатрію едетат, вода для ін'єкцій.

## Лікарська форма

Краплі очні.

## Основні фізико-хімічні властивості:

прозора безбарвна рідина.

## Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протинабрякові і протиалергічні засоби. Симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби. Тетризолін. Код ATX S01G A02.

## Фармакологічні властивості

### Фармакодинаміка.

Тетризолін при зовнішньому застосуванні стимулює альфа-адренорецептори симпатичної нервової системи, що викликає звуження судин зі зменшенням набряку тканин; зменшує почервоніння, печіння, подразнення, свербіж, болючість і сльозотечу.

### Фармакокінетика.

Судинозвужувальна дія розвивається через декілька хвилин після закапування в око і триває до 4 годин.

Тетризолін практично не всмоктується при місцевому застосуванні в терапевтичних дозах.

## Показання

Симптоматичне тимчасове полегшення вторинної гіперемії очей внаслідок помірного подразнювального впливу.

### **Протипоказання**

Підвищена чутливість до складових препарату, закритокутова глаукома.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не слід змішувати очні краплі Віаль Лайт з будь-якими іншими краплями.

### **Особливості застосування**

Застосування препарату може спричинити мідріаз.

*Слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря, якщо покращання не спостерігається протягом 72 годин, подразнення чи гіперемія продовжуються або погіршуються, з'являються біль в оці чи порушення зору.*

*Допоміжна речовина бензалконію хлорид може спричинити подразнення. Необхідно уникати контакту з м'якими контактними лінзами (зняти контактні лінзи перед нанесенням препарату та встановити через 15 хвилин після застосування). Бензалконію хлорид може знебарвлювати м'які контактні лінзи.*

Для уникнення забруднення не торкайтесь верхньою частиною флакона до будь-яких поверхонь. Закрити ковпачком флакон після використання.

*Застосування крапель у дітей віком від 2 до 6 років проводити з обережністю.*

Хворим на тяжкі серцево-судинні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, феохромоцитома і порушення обміну речовин (гіпертиреоз, цукровий діабет), а також хворим, які отримують інгібітори моноамінооксидази чи інші препарати, що здатні підвищити артеріальний тиск, слід застосовувати очні краплі Віаль® Лайт лише в тому випадку, коли, на думку лікаря, можлива користь переважає потенційний ризик.

*Дуже часте застосування може спричинити почервоніння очей.*

### **Віаль® Лайт доцільно застосовувати лише у разі легкого подразнення очей. Пацієнт повинен знати:**

якщо протягом 48 годин стан не поліпшується, подразнення або почервоніння тривають чи зростають, слід припинити застосування препарату;

якщо подразнення чи почервоніння пов'язані із серйозними захворюваннями органів зору (інфекція, стороннє тіло чи хімічна травма рогівки), рекомендується звернутися до лікаря;

якщо з'являються інтенсивний біль в очах, головний біль, швидка втрата зору, раптова поява перед очами плям, що «плавають», почервоніння очей, біль під час дії світла або двоїння в очах, слід негайно звернутися до лікаря.

*Слід уникати тривалого застосування та передозування, особливо у дітей.*

**У разі зміни кольору чи помутніння розчину препарат не придатний для використання.**

Не слід застосовувати очні краплі Віаль® Лайт пацієнтам з епідермально-епітеліальною дистрофією рогівки.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Адекватні та добре контрольовані дослідження впливу тетрагідрозоліну гідрохлориду на плід не проводились. Відсутні дані про екскрецію препарату у грудне молоко.

*Незважаючи на те, що препарат не призначений для системної експозиції, перед його застосуванням вагітним та жінкам, які годують груддю, рекомендована консультація лікаря для оцінки можливого ризику.*

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Вплив є малоімовірним.

### **Спосіб застосування та дози**

До початку застосування ковпачок флакона щільно не загвинчувати!

Перед першим застосуванням крапель максимально загвинтити ковпачок флакона. При цьому шип, що знаходиться на його внутрішньому боці, проколює отвір у флаконі.

Безпосередньо перед застосуванням треба потримати флакон у долоні, щоб підігріти його до температури тіла.

Ковпачок відгвинтити, зняти, злегка натискаючи на корпус флакона, розчин закапати в око (кон'юнктивальну порожнину).

Щоб запобігти витіканню розчину при зберіганні, після закапування препарату ковпачок щільно загвинтити, щоб шип, якій знаходиться на внутрішньому боці кришечки, закрив отвір у флаконі. Зберігати препарат згідно з рекомендаціями, наведеними у розділі «Умови зберігання» (у вертикальному положенні).

*Віаль® Лайт призначений лише для місцевого застосування в офтальмології.*

Застосовувати розчин протягом більш ніж 72 годин можна тільки під наглядом лікаря.

Дорослим та дітям старше 6 років закапують по 1-2 краплі в кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей) до 4 разів на добу.

Дітям віком від 2 до 6 років препарат застосовувати лише за призначенням та під наглядом лікаря.

### **Діти**

Досвід застосування препарату дітям віком до 2 років відсутній.

Дітям віком від 2 до 6 років застосовувати за призначенням лікаря.

### **Передозування**

При застосуванні препарату згідно з рекомендаціями передозування є малоймовірним.

При передозуванні препарату може спостерігатися наростання гіперемії або реактивна гіперемія.

**Симптоми, що можуть спостерігатися про коковтуванні або надмірному застосуванні препарату:** брадикардія, сонливість, зниження артеріального тиску, апатія та зниження температури тіла. Додатковими симптомами, що можуть спостерігатися тільки при коковтуванні препарату, можуть бути апное, пригнічення ЦНС та кома.

**Лікування.** При коковтуванні препарату лікування полягає у прийомі активованого вугілля та звільненні шлунка. Подальше лікування має бути симптоматичним та підтримуючим.

### **Побічні реакції**

Побічні реакції, що пов'язані із застосуванням тетрагідрозоліну гідрохлориду, спостерігалися у післяреєстраційному періоді.

**Особливі види чутливості:** відчуття печіння в очах, подразнення слизової оболонки очей, біль в очах, почервоніння очей, різь в очах,

реакції гіперчутливості, розширення зіниць (мідріаз), реактивна гіперемія ока («рикошетна» гіперемія ока).

Іноді можуть виникати системні симпатоміметичні ефекти.

### **Термін придатності**

3 роки.

**Термін придатності препарату після відкриття флакона – 28 діб.**

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 10 мл у флаконі. По 1 флакону у пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПАТ «Фармак».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.

Інструкція препарату Віаль Лайт представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Віаль Лайт з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш осособистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!